




СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ
ЦЕНТР СПИД

ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ- ИНФЕКЦИИ В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ



Актуальность профилактики ВИЧ-инфекции в трудовых коллективах, в современном мире

ВИЧ-инфекция является хроническим неизлечимым и смертельно опасным заболеванием;

Отсутствуют методы специфической профилактики ВИЧ-инфекции (вакцины и сыворотки);

Отсутствуют лекарственные препараты, избавляющие организм человека от вируса иммунодефицита человека;

Распространение ВИЧ вне «классических» уязвимых групп - в обычных семьях;

Высокий уровень распространенности ВИЧ-инфекции в России - свыше 1 млн инфицированных человек, из которых число работающих граждан составляет около 65 %.

80 % ВИЧ-инфицированных – это люди старше 30 лет.

Низкий уровень информированности работающего населения Ставропольского края по вопросам профилактики ВИЧ

**НИЗКИЙ УРОВЕНЬ МОТИВАЦИИ К РЕГУЛЯРНОМУ
ДОБРОВОЛЬНОМУ ОБСЛЕДОВАНИЮ НА ВИЧ**

**ВЫЯВЛЕНИЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ НА ПОЗДНИХ
СТАДИЯХ**



**РАЗВИТИЕ ОПОРТУНИСТИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ: ТУБЕРКУЛЕЗ, ОНКОЛОГИЯ
СНИЖЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ.
УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ НА ЛЕЧЕНИЕ**

**БОЯЗНЬ СОЦИАЛЬНОЙ СТИГМЫ И
ДИСКРИМИНАЦИИ БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ПОСЛЕДСТВИЙ ВИЧ -ИНФЕКЦИИ**

ОТКАЗ ОТ ДИСПАНСЕРНОГО УЧЕТА И ЛЕЧЕНИЯ



**ИНФИЦИРОВАНИЕ ВИРУСОМ
ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА КОНТАКТНЫХ
ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ**

ВИЧ-инфекция в Ставропольском крае с 1987г. по 31.12.2020г.

На территории Ставропольского края общее количество ВИЧ-инфицированных местных жителей, с учетом выявленных на территории края и за его пределами, составило **6576 человек**.

Умерло от ВИЧ в крае – более **1233 человек**.

Проживает в настоящее время – более **5343 человека** с ВИЧ-инфекцией

В 2020 году мужчины составили **68%** от общего количества впервые выявленных.


В 2020 году основной фактор заражения - гетеросексуальный контакт – **60,4%**

Распределение ВИЧ-инфицированных лиц, выявленных в 2020 году, по социальным группам характеризовалось, преобладанием социально-адаптированного населения – **53,2%**


ВИЧ-инфекция в Ставропольском крае



Возрастная структура ВИЧ-инфицированных



Распределение ВИЧ инфицированных, выявленных в 2020г., по социальным группам




Цель

профилактических
мероприятий
по ВИЧ
в трудовых
коллективах

**Снижение количества
новых случаев ВИЧ-
инфекции среди
работающего населения
Ставропольского края.**

Методология организации профилактики ВИЧ-инфекции на предприятии

- **Разработка и утверждение политики предприятия** по вопросу профилактики ВИЧ/СПИДа в трудовом коллективе с целью воспитания толерантного отношения к коллегам, регулярно проходящих обследование на ВИЧ, людям, живущим с ВИЧ-инфекцией (создание безопасной, здоровой атмосферы в трудовом коллективе, в которой нет места предвзятого негативного отношения (дискриминации и стигматизации) к человеку, живущему с ВИЧ-инфекцией).
- **Разработка, утверждение и реализация плана мероприятий** по профилактике ВИЧ-инфекции на предприятии.
- **Назначение ответственного лица** за реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ/СПИДа в трудовом коллективе.



Методология организации профилактики ВИЧ-инфекции на предприятии

- **Создание и утверждение рабочей группы по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции на рабочих местах на предприятии в составе:** представителей управленческого звена, руководителей структурных подразделений, представителей профсоюзной организации, отдела кадров, службы охраны труда, медицинских работников.
- **Обучение ответственного лица и исполнителей мероприятий по профилактике ВИЧ/СПИДа в подразделениях трудового коллектива** (изучение методических рекомендаций, участие в семинарах, тренингах)



Методология организации профилактики ВИЧ-инфекции на предприятии

- **Включение вопросов профилактики ВИЧ** (в том числе регулярного обследования на ВИЧ) и недопущения дискриминации и стигматизации работников, живущих с ВИЧ-инфекцией, **в программы вводного и повторных инструктажей по охране труда, а именно:**
 - донесение информации по предотвращению распространения ВИЧ-инфекции до каждого работника, с обязательным использованием электронного обучающего модуля по вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа на рабочем месте, размещенного в Единой общероссийской справочно-информационной системе по охране труда (ЕИСОТ) (при наличии технической возможности)
 - раздача информационных материалов;
 - проведение анкетирования и коллективных акций по тестированию на ВИЧ.

От лиц, поступающих на работу или уже работающих, нельзя требовать прохождения тестирования на антитела к ВИЧ.

Организация информационно–просветительской кампании по профилактике ВИЧ-инфекции на предприятии



- издания информационных материалов (листовок, плакатов, буклетов и пр.) с последующим распространением среди сотрудников;



- оформление стендов;



- привлечение территориальные СМИ (газета, радио и т.д.), к распространению информации о профилактике ВИЧ/СПИДа;



- транслирование видеороликов и видеофильмов среди сотрудников предприятия на рабочих местах;

- размещение на корпоративном сайте предприятия ссылки на сайт ГБУЗ СК «Краевой центр СПИД» (www.spid-26.ru)

Методология организации профилактики ВИЧ-инфекции на предприятии

- **Включение вопросов профилактики ВИЧ/СПИДа и необходимости регулярного обследования на ВИЧ** в мероприятия профсоюзной организации предприятия, актива молодежи предприятия, совета предприятия по работе с молодежью.
- **Проведение акции «Добровольное и конфиденциальное консультирование и тестирование на ВИЧ на рабочих местах»** с применением метода экспресс-тестирования на ВИЧ, которая по предварительной заявке предприятия может быть проведена сотрудниками ГБУЗ СК «Краевой центр СПИД» либо ГБУЗ СК «Благодарненская РБ»



Методология организации профилактики ВИЧ-инфекции на предприятии

- **СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ РАБОЧИХ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАБОТНИКОВ, ЖИВУЩИХ С ВИЧ/СПИД,** создание такой обстановки, которая обеспечивает оптимальное физическое и умственное состояние работников и адаптацию условий труда к их возможностям:
 - обеспечение работникам, живущим с ВИЧ/СПИД, разумное изменение условий труда, способствующее продолжению занятости (предоставление дополнительных перерывов для отдыха, времени для посещения врача, отпуска по болезни, неполную занятость, возможность возвращения на работу после вынужденного перерыва, связанного с прохождением курса лечения и пр.)
- **ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМ РАБОТНИКАМ В СЛЕДУЮЩИХ ВОПРОСАХ:**
 - получение информации по вопросам доступных услуг, в рамках официально действующих программ медико-социального обеспечения и программ в сфере труда;
 - оказание посильной материальной поддержки (в случае необходимости);
 - помощь в нахождении организаций, предоставляющих консультативные и другие услуги (например, группы самопомощи, неправительственные организации и др.).



Информация для сотрудников по ВИЧ-инфекции

**для проведения вводного и повторных
инструктажей по охране труда**

ЧТО
ТАКОЕ
«ВИЧ»,
«ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ»
И
«СПИД» ?

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека

ВИЧ-инфекция – заболевание, развивающееся у человека после инфицирования вирусом иммунодефицита человека

СПИД – это самая тяжелая стадия ВИЧ-инфекции, при которой иммунитет человека разрушен вирусом настолько, что человек начинает страдать от различных инфекционных и онкологических заболеваний.

СПИД – это ВИЧ-инфекция без лечения.

ЧЕМ ОПАСЕН ВИЧ ?

При проникновении в организм человека вирус поражает клетки иммунной системы.

По мере ослабления иммунитета организм становится более уязвимым для различных инфекций и опухолей (т.е. вторичных заболеваний).

Без приема антиретровирусных препаратов, подавляющих размножение вируса иммунодефицита, инфицированные лица умирают в среднем через 9-11 лет.

КАК ПЕРЕДАЕТСЯ ВИЧ ?

Источник ВИЧ-инфекции - только человек на всех стадиях заболевания.

ВИЧ передается только тремя путями:

- «кровь в кровь» (преимущественно через иглы и шприцы, загрязненные кровью больного ВИЧ-инфекцией);
- половым путем (при любом незащищенном половом контакте, т.е. без презерватива);
- от матери ребенку (во время беременности, в родах и при грудном вскармливании).

**ЧЕРЕЗ ЧТО
ПЕРЕДАЕТСЯ
ВИЧ ?**

Кровь

Грудное молоко

Сперму

Вагинальный секрет

КАК НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ ВИЧ

- ▶ Через воздух при разговоре и кашле
- ▶ Через рукопожатия и объятия
- ▶ Через поцелуи
- ▶ Через общую посуду и продукты питания
- ▶ Через места общего пользования
- ▶ Через насекомых
- ▶ Через домашних животных и птиц

КТО В ГРУППЕ РИСКА ПО ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ?

▶ ВИЧ касается каждого при:

- незащищенных половых контактах;
- при употреблении наркотических и других психоактивных веществ, особенно при их внутривенном использовании.

К уязвимым группам по ВИЧ относятся:

- подростки и молодежь;
- лица, ведущие половую жизнь;
- беспризорные дети, лица без определенного места жительства, мигранты;
- лица, находящиеся в местах лишения свободы;
- медицинские работники.

КАК
ОБНАРУЖИТЬ
ВИЧ-
ИНФЕКЦИЮ

Единственный способ -
ЭТО провести анализ
крови на антитела к
вирусу
иммунодефицита
человека.

СКРЫТЫЙ ПЕРИОД ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

- С момента заражения до первых проявлений ВИЧ-инфекции проходит от 3-4 недель до нескольких лет.
- Антитела в крови появляются в период от 3-х месяцев до 6-ти месяцев (*период серонегативного «окна»*), в редких случаях до 12-ти месяцев после заражения.
- Длительное время человек не ощущает этого заболевания: работает, занимается спортом, ведет активную половую жизнь, создает семью.
- По внешним признакам невозможно определить, заражен человек ВИЧ или нет.
- Не существует специфических признаков заражения ВИЧ.

**ВИЧ- ЭТО
ВСЕГДА
ЗАБОЛЕВАНИЕ !**

Не существует «НОСИТЕЛЬСТВА ВИЧ» !!!

С момента заражения человек является источником ВИЧ-инфекции.

С первого дня попадания ВИЧ в организм происходит непрерывное и необратимое разрушение иммунитета.

При положительном анализе на ВИЧ необходимо **ОБЯЗАТЕЛЬНО** обратиться в Краевой центр СПИД для дообследования и уточнения диагноза.

ЛЕЧЕНИЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Добиться «очищения» организма от вируса иммунодефицита человека если произошло заражение – НЕВОЗМОЖНО.

ЦЕЛЬ ТЕРАПИИ – снизить активность вируса, а не избавиться организм от вируса.

Своевременно начатое лечение, назначенное в Центре СПИД, предотвращает развитие иммунодефицита и вторичных заболеваний, сохраняет качество жизни.

Только на фоне специфической терапии продолжительность жизни пациента с ВИЧ-инфекцией не отличается от продолжительности жизни лиц без ВИЧ-инфекции.

Лечение ВИЧ-инфекции пожизненное и бесплатное за счет средств государства.

ЧТО ПОВЫШАЕТ РИСК ЗАРАЖЕНИЯ ВИЧ ?

**Частая смена
полового партнера**

**Случайные половые
связи**

**Половые связи с
представителями
своего пола**

**Употребление алкоголя,
наркотических веществ
(традиционных,
синтетических,
растительных)**

**Использование
инструментария для
маникюра и татуировок,
недостаточно
обработанного после
обслуживания ВИЧ-
инфицированного**

**Использование «общих»
шприцев и игл для
инъекций**

КАК СНИЗИТЬ РИСК ЗАРАЖЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

Регулярно обследоваться на ВИЧ (не реже 1 раза в год)

Вступать в половые связи с партнером, обследованным на ВИЧ

Использовать презервативы при половых контактах

Отказаться от использования психотропных и наркотических веществ в немедицинских целях

Исключить использование нестерильных шприцев, игл и прочего инструментария.

КАК ОТНОСИТЬСЯ К ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМ?

- ▶ ВИЧ не делает человека лучше или хуже
-

- ▶ ВИЧ не делает человека привлекательнее или уродливее
-

- ▶ ВИЧ не делает человека опасным в бытовых условиях
-



ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ?

- ▶ Подробная информация о ВИЧ-инфекции и мерах ее профилактики доступна на сайте **www.spid-26.ru**. или **www:o-spide.ru**
- ▶ С любым вопросом о ВИЧ-инфекции Вы можете обратиться на телефон «Горячей линии» 8-8652-94-52-83.
- ▶ Если проблема ВИЧ-инфекции затрагивает Вас лично или близких Вам людей, обращайтесь в ГБУЗ СК «Краевой центр СПИД» в городе Ставрополе по адресу ул.Ленина дом 434

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

